

การจัดการการผลิตสัปปะรด

ข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัท เดอะชั่นฟาร์ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสัปประรด

- สัปประรดเป็นพืชเขตร้อน ซึ่งอ่อนไหวต่อสารเคมีและเกลือ
- การพ่นปุ๋ยที่มีเกลือผสมมากๆ ส่งผลต่อผิวสัปประรดทำให้ไหม้แดดได้ ฉะนั้นอย่าพ่นปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยเคมี
- สัปประรดจะเปิดปากใบกินอาหารตอนกลางคืนเท่านั้น ฉะนั้นการพ่นปุ๋ยควรทำตอนเย็นเท่านั้น
- สัปประรดปรุงอาหารตอนกลางวัน ฉะนั้นช่วงกลางวันห้ามทำกิจกรรมรบกวนการทำงานของสัปประรด
- โรคสัปประรดส่วนใหญ่ในปัจจุบันเกิดจากการขาดธาตุอาหาร และการบดเน่าของดิน การหมักหมมของสารพิษ
- การพ่นปุ๋ยและยาสัปประรดควรพ่นให้สม่ำเสมอ พ่นให้ทั่วๆ สารที่ดีควรดูดซึมได้เร็ว
- ลำคัญที่สุดของสัปประรด สัปประรดชอบกินคาร์บอนมากที่สุด มากกว่าธาตุใดๆ

ช่วงการผลิตใบสัปปะรด

สัปปะรดมีการเจริญเติบโตของใบช้า การเร่งผลิตใบสัปปะรดจนเกินไปด้วยปุ๋ยไนโตรเจนสูง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้อวัยวะใบอ่อนแอมากและง่ายต่อการทำลายด้วยโรคและแมลง การผลิตใบสัปปะรดควรเน้นที่การเติมธาตุอาหารรองกลุ่มแคลเซียม ดินที่มีค่าเป็นกลางจะช่วยให้สัปปะรดแข็งแรงกว่าปกติ ควรใช้กรดอะมิโนผลิตสัปปะรด เพราะเนื้อเยื่อและอวัยวะสัปปะรดจะแข็งแรงมาก

สูตรการทำใบจึงเป็น

ซูเปอร์ไคโตซาน + เทอรา + ซิลิคอน

300 ซีซี + 300 ซีซี + 10 ซีออนโต้ะ

ละลายน้ำ 200 ลิตรพ่นให้ทั่ว

*** อัตราส่วนของสารจะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุของสับปะรดเสมอ

รอยต่อช่วงเตรียมกระตุ้นตาออก

โอเมก้า + เทอรา + ซิลิคอน
200 ซีซี + 400 ซีซี + 15 ช้อนโต๊ะ
ละลายน้ำ 200 ลิตรพ่นให้ทั่ว

*** ทำให้คาร์บอนสะสมที่เนื้อเยื่อใบให้เยอะขึ้น เพื่อเปลี่ยนเป็น
คาร์โบไฮเดรต สัปดาห์จะมีแรงส่งเพื่อสร้างลูก สังเกตความหนาของใบ

หลังจากกระตุ้นคอกเรียบร้อยแล้ว

ซูเปอร์ไคโตซาน + โอเมก้า + เทอรา + ซิลิคอน

300 ซีซี + 200 ซีซี + 400 ซีซี + 15 ซ็อนโต้ะ

ละลายน้ำ 200 ลิตรพ่นให้ทั่ว

*** ลูกสัปปะรดที่โผล่ออกมาช่วงแรกจะอุดมไปด้วยเนื้อเยื่อเปลือก จึงทำให้เนื้อเยื่อเปลือกหนา เพื่อกันแตก ไหม้ แดงเผา ซูเปอร์ไคโตซานจะมาช่วยเร่งการสร้างตรงนี้ในช่วงสั้นๆ ตอนนี้สัปปะรดจะเคঁ็นสารอาหารที่สะสมในใบเพื่อประคองลูก

ช่วงขยายลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว

ซูเปอร์โคโตซาน + โอเมก้า + เทอรา + เฟมโต้

300 ซีซี + 200 ซีซี + 400 ซีซี + 200 ซีซี

ละลายน้ำ 200 ลิตรพ่นให้ทั่ว

*** ช่วงนี้ ฤดูกาลจะร้อนแรงมาก และลูกจะเสียหายจากการไหม้ แดงเผา การปลูกทางมาดีของเราจะเกิดปัญหาน้อยมาก ใช้เฟมโต้เพียงแค่ 1-2 ครั้งก็เพียงพอต่อการสังขยาผลสัปปะรด

จบฤดูกาล

ไวตามิค คอนโทรล + เชื้อตั่ว

500 ซีซี + 200 ซีซี

ละลายน้ำ 200 ลิตรพ่นให้ทั่ว

*** ให้ตัดการหมักหมมของเชื้อราและเปลี่ยนดิน เพราะปัญหาคือเศษซากวัชพืช
ที่กองอยู่ในไร่สัปปะรดเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียก่อโรค อย่าลืมพ่น สารทั้ง
สองตัวร่วมเวลาพบการระบาดของโรคที่มีเชื้อมาจากต้นทุเรียนและยางพารา