



The Sun Farm Marketing Company Limited

102/18 Prime Estate Moo.2 Soi.King Kong,

Bang Sao Thong District , Samut Prakarn Province , Thailand 10540

Telephone : +66 99 55 99 171 E-mail : Thesunfarm@hotmail.com

การผลิตมะม่วงนอกฤดู

January	Febuary	March	April	May	June
ดอกมะม่วง ทยอยออกจน ครบ / ขยายผล มะม่วง / ห่อผล มะม่วง	ขยายลูกมะม่วง / ติดต่อพ่อดำรับ ซื้อ	ขายผลมะม่วง	ขายผลมะม่วงใน ฤดู / ตัดหญ้าใน แปลงรอฝน / ตัดแต่งกิ่งมะม่วง	ตัดแต่งกิ่งมะม่วง / ตัดหญ้าใน แปลงมะม่วง / ไถพรวนดิน	บำรุงต้นมะม่วง / ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สูตรเสมอ หรือ ยูเรีย

July	August	September	October	November	December
พ่นฮอร์โมน อาหารเสริม / สารป้องกันโรค / พ่นสารป้องกัน แมลง	พ่นฮอร์โมน อาหารเสริม / สารป้องกันโรค / พ่นสารป้องกัน แมลง / เน้นการ ผลิตใบที่ สมบูรณ์ กิ่งที่ สมบูรณ์	ใบเริ่มเข้าระยะ เพลลาต / พ่น อาหารเสริม / แบ่งใส่ปุ๋ยทาง ดินครั้งที่ 2 / ดูแลเรื่องโรค แมลง	ใบเริ่มเข้าระยะ แก่ / ใบสะสม อาหาร กิ่งสะสม อาหาร / ดูแล เรื่องโรคแมลง	พ่นสารบังคับ ออกดอกนอก ฤดู / พ่น ฮอร์โมนเปิดตา บังคับตาดอก / พ่นสะสมอาหาร	ต้นมะม่วงเริ่มปริ ตาดอก / พ่น ฮอร์โมนล้างดอก ล้างข้อ / บำรุง ลูกที่ติดแล้วให้ ขยายต่อ

จากตารางจะเห็นปฏิทินการทำงานของชาวสวนมะม่วงตลอดทั้งปี ว่าแต่ละเดือนทำอะไรบ้าง โดยจะขยายความในหัวข้อต่อไป โดยเริ่มจากเดือนเมษายน นับเป็น ต้นฤดูการผลิต

เมษายน (April) : ในเดือนเมษายนเราจะพบว่า เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวมะม่วง มีมะม่วงทยอยออกสู่ท้องตลาดซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้พักเหนื่อย มีรายได้จากการผลิตและเป็นช่วงที่เหมาะสมในการพักผ่อนของชาวสวนและต้นมะม่วงในเดือนนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงควรทำอะไรบ้าง เดือนนี้มีสภาพอากาศร้อน มะม่วงเพิ่งผ่านการเก็บเกี่ยวมาต้นจะโทรม เกษตรกรเมื่อขายผลมะม่วงแล้ว ควรตัดหญ้ารอบต้นมะม่วงในโรง และรดน้ำต้นมะม่วงในต้นอื่นน้ำ เพราะต้นมะม่วงเสียน้ำไปกับผลมะม่วงมากมายแล้ว เดือนนี้ยังไม่เหมาะแก่การใส่ปุ๋ยทางดิน ให้ดินและต้นไม้พักฟื้นจนอิมเอยเสียก่อน แต่ถ้าต้นไหนมีผลผลิตเยอะสภาพโทรมหนักจากการเก็บเกี่ยว ควรพ่นฮอร์โมนบำรุง แนะนำให้ใช้ฮอร์โมนกลุ่มสารไคโตซาน

Super Chitosan : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 10 วัน

*** ทั้งนี้เราจำเป็นต้องคืนสภาพต้นที่โทรมให้ทันก่อนเข้าฤดูผลิตใหม่ ไม่เช่นนั้นต้นที่โทรมจะโตช้ากว่าเพื่อนๆ

พฤษภาคม (May) : เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนสำคัญ เพราะย่างเข้าฤดูฝน ที่มตัดหญ้ารอไว้ตั้งแต่เมษายนและไถพรวนไว้ด้วยนั้น เพราะดินยังนุ่ม ไม่เคอะแคะ และเมื่อฝนมา ต้นมะม่วงจะได้กินน้ำฝนเต็มที่ทันที โดยไม่มีวัชพืชมารบกวนหรือแย่งกิน เดือนนี้จะเป็นเดือนที่กิ่งก้านสาขามะม่วงจะเริ่มปริ ให้เราดูแลกิ่งและใบอ่อนให้ดี กิ่งไหนออกเยอะเกินไปให้เด็ดออก กิ่งไหนออกในทรงพุ่มมะม่วงให้เด็ดออก เพราะเป็นกิ่งมาระ เราต้องการกิ่งตรง ไม่คด เดือนนี้คือเดือนแห่งการทำใบ เราต้องการใบอ่อนที่ดี แนะนำให้ใช้

Super Chitosan : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

Tera : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

Centi : อัตรา 500 กรัม ละลายน้ำ 1000 ลิตร พ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

มิถุนายน (June) : เป็นเดือนที่เข้าสู่การผลิตเต็มรูปแบบ การตัดหญ้าหรือไถพรวนในเดือนนี้นับว่าช้าเกินไปแล้ว ใครยังไม่ได้ทำให้รีบเร่งทำให้เร็วที่สุด เดือนนี้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นมาก เป็นเดือนที่มะม่วงจะฟื้นเร็วแรงเต็มสภาพ และเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาเต็มที่ เดือนนี้ให้ดูพยากรณ์อากาศ สังเกตฟ้าฝน หากวันต่อไปฝนทำท่าจะตก ให้เราหว่านปุ๋ยบำรุงทางดินไว้ ไม่ว่าจะเป็นสูตร 16-16-16 , 46-0-0 , 21-0-0 , 30-0-0 ล้วนได้ทั้งสิ้น แต่หากมีปุ๋ยกลุ่มหินแร่ธาตุจะช่วยเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของดินได้อีกมาก อย่าใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ซ้ำไปกว่าเดือนนี้ และควรแบ่งใส่ ไม่ใส่เยอะเกินไปเพราะจะทำให้ดินเป็นกรดเร็วมาก นั่นจะส่งผลเสียต่อไปพืชและรากพืช

เดือนนี้แนะนำให้ใช้

Super Chitosan : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

Tera : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

Centi : อัตรา 500 กรัม ละลายน้ำ 1000 ลิตร พ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

หากฝนตกหนักแนะนำให้เพิ่ม

Vitamix Control : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

กรกฎาคม (July) : กรกฎาคมคือเดือนของความแปรปรวน เป็นเดือนที่จะเริ่มต้นปัญหา ในเดือนนี้ในระวางปริมาณน้ำฝนที่ผมแนะนำมาทั้งหมดเรื่องการใส่ปุ๋ยทางดินว่าอย่ามากเกินไปจะมีผลในเดือนนี้ทั้งสิ้น หากใครใส่ปุ๋ยมาก ปุ๋ยในโตรเจนและเกลือที่ตกค้างในดินจะเริ่มทำปฏิกิริยา ทำให้ดินเป็นกรดที่ละนิด เดือนนี้แมลงหลายชนิดเริ่มออกหาอาหารเพราะใบพืชอ่อนๆ ที่เพิ่งแตกใหม่เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนชั้นดี และเอร็ดอร่อยมาก ฉะนั้นเมื่อเกิดการกัดเจาะไปที่ราก ใบ กิ่ง ของต้นไม้แล้วสภาพแวดล้อมมีความเป็นกรด รากน่าจะเริ่มมา เพราะกรดในน้ำที่ละลายในดินจะซึมเข้าไปในรากและกินลามไปถึงโคนใบและกิ่งก็เช่นกัน หากเกษตรกรเลือกใช้สารเคมีทำลายตั้งแต่ระยะแรก จะเกิดความเสียหายแก่ต้นไม้อย่างหนัก ในเดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นของโรคต่างๆ ฉะนั้นแนวคิดในการจัดการให้ผ่านพ้นเดือนนี้คือ ไม่ใช้ทำอย่างไรให้แมลงศัตรูพืชตาย แต่จะทำอย่างไรให้มันป่วย วิธีแรกคือ ต้องทำให้มันเข้ากัดกินต้นไม้ไม่ได้ เมื่อกินได้น้อยลงก็หิวและป่วย อนุรักษ์ตัวห้ำและเบียนไว้ให้เป็นแมลงผู้ช่วยของสวนเราในการเข้าทำลายแมลงศัตรูพืช โรคจะระบาดก็ต่อเมื่อต้นไม้ป่วย เนื้อหาในเดือนนี้ต้องทำให้ต้นไม้แข็งแรงที่สุด เพราะต้นไม้ตากฝนอยู่ตลอดเวลาเร่งการเป็นหวัดมาก

เดือนนี้แนะนำการจัดการดังนี้

Vitamix Control : อัตรา 2 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Tera : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Centi : อัตรา 1 กิโลกรัม ละลายน้ำ 1000 ลิตร พ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

สิงหาคม (August) : เดือนรอยต่อของเดือนแห่งความแปรปรวน เป็นเดือนที่กิ่งก้านสาขาของต้นไม้จะเจริญเติบโตถึงที่สุด คือ กิ่งก้านเริ่มยืดยาว การใช้ไนโตรเจนมากไป จะทำให้กิ่งและใบยาวจนเกินไป แนะนำให้ใช้สารอินทรีย์ฉีดพ่นอย่างที่เหมาะสมจะทำให้กิ่งและใบสมดุล ยังคงต้องโฟกัสไปที่ใบและกิ่ง หากกิ่งโตเยอะเกินไปให้ริดออก เพื่อให้เกิดกิ่งการระคายเคืองที่สุด เดือนนี้เนื้อหายังคงโฟกัสไปที่การทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงที่สุด เพราะเป็นฤดูแห่งการระบาดของโรคและแมลง การพ่นยาและฮอร์โมนเสมือนเป็นวัคซีนคือ ไม่รอให้เกิดการระบาดแล้วค่อยพ่น แต่พ่นเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดคือ ใจความสำคัญ เดือนนี้ค่อนข้างเปลืองงบประมาณการพ่นยาสักหน่อย แต่ยอมดีกว่าให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขทีหลัง

เดือนนี้แนะนำให้ใช้

Vitamix Control : อัตรา 2 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Tera : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Centi : อัตรา 1 กิโลกรัม ละลายน้ำ 1000 ลิตร พ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

*** หากมีฝนตกชุกมาก ในรวันฟ้าเปิดฝนหยุดแล้วทำการพ่นยา ซึ่งปฏิทินการทำงานในเดือนนี้ต้องยืดหยุ่น ห้ามยึดติด เพราะฝนฟ้าอากาศกำหนดแน่นอนไม่ได้เอาเสียเลย

Zetta : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Picco : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

*** จะพบว่าเรากำหนดวันฉีดพ่นให้ถี่ขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสภาพอากาศและการผลิต นี่เป็นเดือนที่เกษตรกรต้องทำงานหนัก

กันยายน (September) : และแล้วก็เข้าสู่เดือน 9 เดือนนี้มีเวลาให้เราพอพักหายใจ เนื่องจากฝนเริ่มซา และตกๆหยุดๆ สลับกันไป เราเข้าสู่ช่วงเวลาที่ใบมะม่วงเข้าระยะวัยรุ่น หรือที่เรียกว่า ใบ เพลลาด เป็นช่วงที่ใบเริ่มขยาย เมื่อเราเตรียมตัวมาดีตั้งแต่ต้น ในเดือนนี้ใบเพลลาดของเรา จะยาวใหญ่และแข็งแรงมาก โรคแอนแทรคโนส โรคใบไหม้เข้าทำลายได้น้อยมาก จนถึงไม่มี ในเดือนนี้ถ้าทำได้อยากให้เราไถพรวนอีกครั้ง โดยไถกลบหญ้าเท่านั้นเพื่อทำลายที่หลบซ่อนของแมลง และพลิกหน้าดินชั้นล่างที่เกิดการหมักหมมในช่วง 2 เดือนที่แล้วให้รับแสงแดด และเป็นเดือนที่เราจะเริ่มหว่านปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยยึดถือรูปแบบเดิมคือ หว่านแต่น้อย เราแค่ต้องการเติมสารอาหารในดินเพื่อรับกับช่วงทำใบเพลลาดเท่านั้น ปุ๋ยที่แนะนำช่วงนี้คือ ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 , 17-17-17 หรือปุ๋ยโดโลไมท์ ปุ๋ยปรับสภาพดินเพอร์ไลต์ก็ได้ทั้งสิ้น โดยงดใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเดี่ยวๆเด็ดขาด เดือนนี้ควรเป็นเดือนที่เราต้องเทไปที่การเพิ่มธาตุแคลเซียม แมกนีเซียมและกำมะถัน เพื่อการดูแลต้นที่สมบูรณ์

และอย่างเดิม ไม่มีการใส่ปุ๋ยมากเกินไปในการผลิตพืช ให้ใช้อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น โดยหว่านรอบๆทรงพุ่ม ห้ามใส่ชิดโคนต้นเด็ดขาด

เดือนนี้แนะนำให้ใช้

Vitamix Control : อัตรา 2 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Tera : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Centi : อัตรา 1/2 กิโลกรัม ละลายน้ำ 1000 ลิตร พ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

ตุลาคม (October) : เดือนนี้ใบจะเริ่มเข้าสู่ระยะใบแก่แล้ว คือ ใบมีสีเขียวเข้ม สิ่งที่เราควรเน้นไปที่สุดในเดือนนี้คือ การเพิ่มปริมาณ คาร์โบไฮเดรตในใบ และโปรตีนในลำต้น ซึ่งสารอินทรีย์ทั้งสองสารเราจะได้จาก ผลิตภัณฑ์ **Tera** เพื่อให้ใบสมบูรณ์หนา ใหญ่ กิ่งหลักและกิ่งแขนง อวบแข็งแรง ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ระยะใบสะสมอาหาร ซึ่งตอนนี้ไนโตรเจนต้องไม่มีในระบบการผลิตแล้ว และให้เน้นไปที่ธาตุคาร์บอนแทน

แนะนำ

Tera : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Omega : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

*** หากพบแมลงเข้าทำลายช่วงนี้ให้พ่น

Picco : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Vitamix Control : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

*** เดือนนี้หากใครผลิตเร็ว จะเริ่มพ่นสารบังคับดอก แต่หลักการพ่นสารบังคับก็คือ ต้องรอให้ต้นสมบูรณ์ก่อนจึงพ่น หากต้นไม่สมบูรณ์แล้วพ่นจะให้ผลเสียตามมา คือ ดอกร่วง ดอกไม้ติดลูก ดอกเน่า เป็นต้น

พฤศจิกายน (November) เดือนนี้เกษตรกรเริ่มใช้สารบังคับนอกฤดูกาลกันอย่างเข้มข้น เน้นอนว่า การใช้สารเพคโค บิวทราโซล ในอัตราเข้มข้นทั้งราดทางดินหรือฉีดพ่นทางใบส่งผลเสียต่อต้นมะม่วง ในการออกรากใหม่และเหี่ยวใบ ทำให้ใบไหม้เกินกว่าจะดูดกินอาหารและสังเคราะห์อาหารเพื่อแบ่งตาดอกได้ ฉะนั้นการสะสมคาร์บอนมาเรื่อยๆ ด้วยวิธีการผลิตของเรา จึงมีความสำคัญเพราะเราไม่ต้องการทรมานต้นมะม่วง มิเช่นนั้นในปีต่อไปต้นมะม่วงจะไหม้มากและให้ผลผลิตน้อยลงถนัดตา โดยปกติ สุนทรเปิดตาดอกเกษตรกรมีมากมาย เน้นอนว่ามีทั้งถูกและผิด ขอย้ำอีกครั้ง บริษัท เราไม่เน้นให้มีธาตุไนโตรเจนอยู่ในช่วงระยะทำดอกเด็ดขาด เพราะมันถ่วงขั้นตอนการผลิตดอก

แนะนำ

Omega : อัตรา 1-2 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

Centi : อัตรา 1 กิโลกรัม ละลายน้ำ 1000 ลิตร พ่น 3 รอบ ห่างกัน 10 วัน

ธันวาคม (December) – เก็บเกี่ยว (Harvest) ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ภารกิจหลักจะคล้ายๆกัน คือ การเลี้ยงดอกจนติดผล และการเลี้ยงผลจนมีขนาดใหญ่พร้อมจำหน่าย ซึ่งตั้งแต่เดือนนี้จนกว่าจะเก็บเกี่ยวใช้เวลา 2-3 เดือนโดยประมาณ เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรพ่นสารเคมีฆ่าแมลงเข้มข้นหรือมีฤทธิ์ร้อนเด็ดขาด เพราะจะทำให้ต้นสลัดดอก ดอกร่วง กรณียืดออกร่วงมี 2 กรณี คือ ไนโตรเจนเยอะ และการพ่นสารเคมีมากเกินไป เดือนเหล่านี้ควรระมัดระวัง และการพ่นสารกำจัดแมลงหรือโรคพืชควรพิจารณา การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ติดดอก เราจะใช้สารโอเมก้าของบริษัท กัน และการขยายลูกเราจะเน้นใช้ เทอรา กรดอะมิโนเข้มข้น

แนะนำ – ช่วง ติดดอกจนถึงผลอ่อน

Omega : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

Centi : อัตรา 1 กก ละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

Tera : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

แนะนำผลไซ้ไก่ – ผลใหญ่

Centi : อัตรา 1 กก ละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

Tera : อัตรา 1 ลิตรละลายน้ำ 1000 ลิตรพ่น 2 รอบ ห่างกัน 15 วัน

****** หากมีโรคและแมลงรบกวนให้ใช้ยาตามอัตราส่วนที่เคยกล่าวมาแล้ว**